



DISREFLEXIA



Síndrome caracteritzat per un increment abrupte i marcat de la pressió arterial, que es dona més freqüentment en lesions medul·lars per sobre del nivell Dorsal 6 (D6).



SÍMPTOMES

- Quadre sobtat de cefalea polsant.
- Congestió nasal.
- Sudoració i envermelliment de la pell per sobre del nivell de la lesió.
- Sentir-se inquiet i tremolós.

Ens podem trobar:

- Batecs del cor més lents (bradicàrdia).
- Elevació de la pressió sanguínia de 20 a 40mmHg per sobre del normal.



CAUSES:

- Retenció urinària.
- Infecció.
- Estrenyiment excessiu (femta dura i seca).
- Úlceres per pressió.
- Ungles encarnades.





ACTUACIÓ

- Elevar el capçal del llit a 90° si és possible.
- Retirar qualsevol pressió que tingui en el del cos, per exemple, el cinturó.
- Si és portador de sonda, cal revisar:
 - Que el drenatge sigui correcte.
 - La possible obstrucció de la sonda.
 - Si la bossa d'orina està plena.
- Si es realitza cateterismes, buidar la bufeta.
- Si els símptomes són produïts per estimulació rectal, suspendre-la immediatament.
- Si no remeten els símptomes en pocs minuts, trucar al servei d'urgències.

Anotacions:
